

# Edition Speciale Corse

Bulletin Technique nº 50 du 14 Février 1985.

P,4

- La lutte contre l'Esca, l'Excoriose, les Cochenilles est toujours d'actualité.
- Cloque du pêcher : ne tardez pas.

DLP 28-2-85487290

- Entretien des fraisiers, désherbage des pommes de terre, plantation de tomates, les maladies des salades.

#### VIGNE

## Esca, Excoriose: rappel.

Les traitements à base d'arsenite de soude doivent être réalisés sur bois bien ressuyés, au moins 2 semaines après la taille et 2 semaines avant le débourrement.

Manipuler avec précaution l'arsenite de soude. C'est un produit très toxique. Ne pas boire ni fumer ni manger pendant l'application. Portez des gants et un masque. N'utilisez que des spécialités contenant un répulsif : Pyralesca R, Pyralumnol R. Traitez par temps sec, en l'absence de vent.

# Cochenilles de la vigne

De nombreux pieds de vigne attaqués par les cochenilles ont été observés pendant la végétation et en toutes régions. C'est la cochenille farineuse qui est la plus fréquente, particulièrement difficile à atteindre car elle hiverne sous les écorces des souches, et des bras et même les grosses racines.

En végétation, on dénombre de 3 à 8 générations par an. D'autres cochenilles sont également présentes comme les lecanines.

Vous pouvez utiliser les huiles jaunes : Dytrol 50, Seppic Verger, Seppic Vigne, Veraline 3 fluide, Dinitrol 3, Elgetiver activé, traitement d'hiver Umupro, dose : 2 à 3,5 1/hl. Effectuez un lessivage des ceps. Cetains acariens seront égale-

#### ARBRES FRUITIERS

# Cloque du pêcher : rappel

La période de sensibilité est atteinte pour de nombreuses variétés (stade B : apparition de la pointe verte sur bourgeons à bois terminaux). Elle dure jusqu'à l'étalement des premières feuilles.

Ne tardez pas à effectuer le traitement avec des spécialités à base de : Captafol, Captane, Ferbame, Thirame ou Zirame. (Voir Bulletin Nº 49).

#### **CULTURES MARAICHERES**

Fraisiers

Avant la couverture des cultures, pulvérisez une bouillie cuprique à 2 %. Surveillez bien les pucerons. Intervenir si nécessaire.Dès l'apparition des fleurs, traiter avec du Rovral, Ronilan ou Sumisclex.

## Désherbage des pommes de terre

Doit être effectué **après** le buttage et **avant** la levée des pommes de terre. Produits utilisables :

Matières actives	Spécialités	Doses
Linuron + Monolinuron	Afalon Spécial, Quinoter	2 kg de produit com- mercial par hectare.
Metobromuron + Terbutryne	Igrater 50	4 kg de produit com- mercial par hectare.
Metobromuron	Patoran	3 à 4 kg de produit commercial/hectare.
Metribuzine	Sencoral Sencoral	1 kg de produit com- mercial/ha. (phytoto- xique pour Jaerla)
Alloxyde sodium + huile	Fervin (à tous les stades de culture)	1 à 1,5 Kg de produit commercial/hectare.

Plantations de tomates

Effectuez avant plantation un traitement à la bouillie bordelaise (150g à 200 g de matière active /hl).

Après reprise des plants, nouveau traitement avec bouillie bordelaise (200 g M.A./hl) ou Chlorothalonil (150 g M.A./hl). Si le temps est couvert, ajouter un anti-Botrytis (Iprodione, Vinchlozoline).

## Maladies des salades

Le temps doux et humide est favorable aux maladies. Vous pouvez utiliser :



- <u>Contre le Mildiou</u> :
  - \* Mancozèbe (Dithane M 45, Sandozèbe).
  - \* Mancozèbe + cymoxanil (Fulvax, Remiltine).
  - \* Phosethyl d'aluminium + mancozèbe (Rhodax).

# - Contre le Botrytis et le Sclérotinia

- \* Iprodione (Rovral).
- \* Procymidone (Sumisclex).
- \* Vinchlozoline (Ronilan).

Arrêter tout traitement au stade 16 à 18 feuilles.

#### -=-=-=-=-=-=-

Les abonnements de l'année 1984 seront terminés le 28/02/1985. Pensez à le renouveler.

Abonnement collectif (plus de 10 abonnements)

Abonnement individuel

60 F.
80 F.

Les chèques seront libellés à l'ordre de : M. le Régisseur des recette de la D. D. A. du VAUCLUSE à AVIGNON et transmis au Service de la PROTECTION des VEGETAUX - Ancienne Conserverie de CASAMOZZA - 20290 BORGO.

-=-=-=-=-=-=-